

Zum Wintervorkommen der Kornweihe (*Circus cyaneus*) im Seewinkel

(vergriffen)

J. Laber Franz -
Zeillergasse 5, 2102 Bisamberg



Kurzfassung

Die vorliegende Arbeit gibt einen Überblick über Vorkommen und Häufigkeit der Kornweihe als Durchzügler und Wintergast im weiteren Gebiet des Seewinkels. Weiters wird das Geschlechtsverhältnis der Art dokumentiert und die Schwankungen im Laufe des Winterhalbjahres diskutiert.

Das ausgewertete Datenmaterial umfaßt Schlafplatzzählungen, Linientaxierungen und Zufallsbeobachtungen aus über zehn Winterhalbjahren. Die Abundanz im behandelten Beobachtungsgebiet beträgt durchschnittlich 4,9 Ex/100 km², kann aber auf den Konzentrationsflächen Hanság, Neudegg und Zitzmannsdorfer Wiesen ein Vielfaches betragen.

Der Anteil adulter Männchen am Kornweihenbestand beträgt durchschnittlich 16-22 %, schwankt aber im Laufe des Winterhalbjahres deutlich. So liegt der Anteil zu den Zugzeiten beträchtlich höher (30-40 %) als im Mittwinter (ca. 15 %).